

鶏肉に存在する細菌・寄生虫の D-値 (分)

	53°C	54°C	55°C	56°C	57°C
セレウス菌(増殖型)	11.5	8.12	5.73	4.04	2.85
ウェルシュ菌(増殖型)	29.42	21.9	16.3	12.83	9.55
ボツリヌス菌(増殖型)	ND	ND	ND	ND	ND
サルモネラ(Senftenberg 含む6種)	66.28	53.88	43.8	26.25	17.35
リステリア・モノサイトゲネス	93.45	60.37	39	25.2	17.88
黄色ブドウ球菌	52.2	38.71	22	22.06	16.36
腸管出血性大腸菌(O157)	30.03	25.35	21.4	15.26	10.88
エルシニア・エンテロコリチカ	19.86	14.78	11	8.19	6.07
カンピロバクター	5	3.39	2.14	1.45	0.8
マンソン裂頭条虫	ND(enevtually?)	ND(enevtually?)	ND(enevtually?)	ND (1 sec)	ND (1 sec)
ブタ回虫	ND(10 sec)	ND(10 sec)	ND(10 sec)	ND(1-10 sec)	ND(1-10 sec)
	58°C	59°C	60°C	61°C	62°C
セレウス菌(増殖型)	2.01	1.42	1	0.71	0.5
ウェルシュ菌(増殖型)	7.11	5.3	3.94	2.94	2.19
ボツリヌス菌(増殖型)	ND	ND	ND	ND	ND
サルモネラ(Senftenberg 含む6種)	11.47	9.32	7.32	4.84	3.2
リステリア・モノサイトゲネス	13.16	9.68	7.12	5.24	3.86
黄色ブドウ球菌	12.13	9	6.67	4.95	3.67
腸管出血性大腸菌(O157)	4.4	3.97	3.35	2.39	1.71
エルシニア・エンテロコリチカ	4.52	3.36	2.5	1.87	1.39
カンピロバクター	0.55	0.37	0.25	0.17	0.12
マンソン裂頭条虫	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)
ブタ回虫	ND(1-10 sec)	ND(1-10 sec)	ND(1 sec)	ND(1 sec)	ND(1 sec)
	63°C	64°C	65°C	66°C	67°C
セレウス菌(増殖型)	0.36	0.25	0.18	0.13	0.09
ウェルシュ菌(増殖型)	1.63	1.21	0.9	0.67	0.5
ボツリヌス菌(増殖型)	ND	ND	ND	ND	ND
サルモネラ(Senftenberg 含む6種)	1.81	1.22	0.8	0.53	0.35
リステリア・モノサイトゲネス	2.84	2.12	1.55	1.14	0.84
黄色ブドウ球菌	2.72	2.02	1.5	1.11	0.83
腸管出血性大腸菌(O157)	0.81	0.58	0.4	0.29	0.21
エルシニア・エンテロコリチカ	1.04	0.77	0.58	0.43	0.32
カンピロバクター	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02
マンソン裂頭条虫	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)
ブタ回虫	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)	ND (1 sec)